

INSETTICIDA

1 - Composizione

100 g di Quick Bayt Spray contengono:

Imidacloprid 10 g;

z-9 -Tricosene: 0,10 g;

LEJ 179: 0,25 g;

Denatonium Benzoato (Bitrex) 0,01 g;

Altri coformulanti q.b. a 100 g.

2 – Sostanza attiva

Imidacloprid

z-9 tricosene

3 – Caratteristiche del prodotto

LA SOLUZIONE PER IL CONTROLLO DELLE MOSCHE

Moschicida in granuli disperdibili in acqua. Applicazione murale a spruzzo (spray).

USO ZOOTECNICO E CIVILE. Uso professionale. NUOVO moschicida in granuli bagnabili. Quick Bayt® Spray con Imidacloprid: il nuovo principio attivo ad elevata capacità abbattente con prolungato effetto residuale. Agisce sia per ingestione che per contatto; è efficace contro le mosche, anche quelle resistenti ad altri insetticidi (carbammati, esteri fosforici, piretrine, piretroidi, clorurati). Quick Bayt® Spray a Tripla azione: (1) Attrattiva, (2) Appetibile per le mosche, (3) Efficace subito e in modo duraturo. Quick Bayt® Spray specifico per applicazione murale a spruzzo utilizzando pompe irroratrici. Quick Bayt® Spray contiene Bitrex, una sostanza estremamente amara che riduce il rischio di ingestione accidentale da parte di persone.

4 - Spettro d'azione

mosche

5 - Aree di impiego

Quick Bayt® Spray è specifico per trattare le zone abitualmente frequentate dalle mosche (muri, intorno alle finestre, aree riparate e soleggiate, sulle porte, sui pilastri, le intercapedini, in prossimità di letamai, concimaie, portici, nei corridoi di servizio, sui recinti, etc.) in allevamenti (avicoli, cunicoli, suinicoli, bovini da carne e da latte, ovicapri, equini), edifici rurali, magazzini, agriturismi, pollai, piccoli allevamenti, depositi di rifiuti, canili, scuderie.

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d'impiego

250 g di QuickBayt spray in 2 litri d'acqua ogni 100 mq di superficie calpestabile dell'ambiente da trattare (40 mq di superficie murale).

Disperdere in acqua e miscelare bene; spruzzare a macchia (spot) con una pompa a bassa pressione (circa 1 bar).

LA SUA AZIONE SARÀ VISIBILE ENTRO POCHI MINUTI

Quick Bayt® Spray fornisce un rapido e duraturo controllo delle mosche in ambiente rurale e zootecnico. Quick Bayt® Spray può essere applicato in presenza di animali, assicurandosi che il prodotto NON venga in contatto con gli animali stessi. Non trattare superfici raggiungibili dagli animali. Utilizzare Quick Bayt® Spray subito dopo la preparazione. Un trattamento risulta efficace fino a 28 giorni. E' sufficiente impiegare Quick Bayt® Spray non più di 5 volte in un anno.

Epoca d'impiego: Aprile - Ottobre. Iniziare il trattamento alla prima comparsa delle mosche. Per migliorare i risultati è bene operare con buone condizioni generali di igiene ambientale e adottare programmi integrati che prevedano anche l'impiego di esche e prodotti antilarvali.

7 - Registrazione

Presidio Medico Chirurgico

Registrazione n°19248 del Ministero della Salute

8 - Simboli di pericolo



Avvertenza: **ATTENZIONE**

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza

INDICAZIONI DI PERICOLO

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

10 - Informazioni per il medico

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

11 – Avvertenze

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non impiegare per trattare il letame. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Posizionare il prodotto in modo da evitare che persone e animali possano venirne a contatto. Da non venderlo sfuso. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate, evitando usi impropri. Non usare su animali, mangiatoie, erogatori d'acqua e attrezzature della mungitura. Non trattare anche le superfici frequentemente toccate dagli operatori. Da non usare in agricoltura. In caso d'incidente o malessere

consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Conservare in luogo asciutto e a temperature non superiori ai 35°C.

12 - Confezione

250 g - 1 kg

13 – Compatibilità

Il prodotto nelle modalità d'uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc.). Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell'impiego di accertarsi dell'assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta.

14 - Informazioni

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati.

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta.

® Marchio registrato Gruppo Bayer