



**CONTROLLO  
LARVE**



## NEPOREX® 2 WDG

Moschicida in granuli, solubili in acqua, per la lotta contro le larve di mosca.

### COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:  
2 g ciromazina pura;  
q.b. a 100 g coformulanti

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Il NEPOREX 2 WDG agisce unicamente sulle larve delle mosche uccidendole sia che si sviluppino nelle concimaie, nelle lettiere permanenti, negli accumuli delle deiezioni, come pure in tutti gli altri substrati o siti idonei allo sviluppo larvale delle mosche.

### MODALITÀ D'AZIONE

NEPOREX 2 WDG interferisce sul ciclo biologico della mosca, provocando la morte delle larve. NEPOREX 2 WDG non può essere utilizzato contro le mosche adulte, quindi deve essere applicato solo nei luoghi di riproduzione delle mosche stesse quali letamaie, lettiere permanenti purchè non a contatto diretto con gli animali, ecc.

### MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

#### VITELLI E BOVINI ALL'INGRASSO

Lo sviluppo delle larve di mosche avviene prevalentemente nelle lettiere lungo le pareti, i divisori e vicino a tutte le aree non calpestate

dagli animali. Queste zone di circa 50 cm. di larghezza, devono essere trattate in maniera uniforme.

#### VITELLI ALLEVATI SU LETTIERE PERMANENTI E BOX VITELLI

Il primo trattamento deve essere effettuato 1-3 giorni prima dell'arrivo degli animali o dopo la comparsa delle prime mosche di primavera. Ripetere il trattamento ad intervalli di 15 giorni.

- Per trattare 10 mq di lettiera umide:

250 g distribuito tal quale.

- Per trattare 10 mq lettiera asciutte:

250 g diluiti in 10 lt di acqua.

250 g diluiti in 1-4 lt di acqua.

#### BOVINI INGRASSO ALLEVATI SU GRIGLIATO

Trattare in modo uniforme l'intera superficie dove si accumulano le deiezioni.

Normalmente due trattamenti a distanza di 15 giorni sono sufficienti.

- Per trattare 10 mq:

250 g distribuiti tal quale a spaglio sul grigliato.

Evitare di utilizzare il prodotto diluito in acqua per non rendere scivoloso il pavimento.

#### SUINI ALLEVATI SU GRIGLIATO PARZIALE O TOTALE

Trattare in modo uniforme l'intera superficie dove si accumulano le deiezioni.

a) Effettuare il primo trattamento in coinciden-

za del vuoto sanitario o dopo la comparsa delle prime mosche di primavera.

Ripetere il trattamento dopo 15 giorni.

b) Oppure un solo trattamento in coincidenza del vuoto sanitario a doppio dosaggio: 500 g per 10 mq.

- Per trattare 10 mq:

evitare di utilizzare il prodotto tal quale

250 g diluiti in 10 lt di acqua

250 g diluiti in 1-4 lt di acqua

#### POLLI

Allevati con fosse per la lettiera (gabbie o grigliato).

Trattare in modo uniforme l'intera superficie dove si accumulano le deiezioni.

Effettuare il primo trattamento quando lo spessore del letame è di 10 cm, ripetere il trattamento ogni 15 gg o quando l'accumulo delle nuove deiezioni supera i 10 cm.

- Per trattare 10 mq letame umido:

250 g distribuito tal quale

- Per trattare 10 mq letame asciutto:

250 g diluiti in 10 lt di acqua

250 g diluiti in 1-4 lt di acqua

#### ALTRI USI

Tutti i substrati idonei ad ospitare lo sviluppo larvale di mosche. (Discariche, scarti di lavorazione nelle industrie alimentari e della lavorazione delle pelli o altro materiale). Il primo trattamento deve essere effettuato distribuendo uniformemente il prodotto sopra il substrato da trattare. Ripetere i successivi interventi ogniqualvolta lo spessore del materiale supera i 10-15 cm.

NEPOREX 2 WDG deve essere distribuito alla dose di 250 g ogni 10 mq di superficie da trattare.

Quanto riportato sulla presente scheda è conforme all'etichetta approvata dal Ministero della Sanità.

#### AVVERTENZE

Il prodotto è tossico se ingerito, inalato o assorbito attraverso la pelle. Conservare in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non trattare mangimi. Non contaminare alimenti, bevande, o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone ed in caso di disturbi ricorrere al medico. Usare guanti nella manipolazione.

In caso di dispersione accidentale:

- per quanto possibile, raccogliere il prodotto e procedere al normale utilizzo;
- dopo aver raccolto il prodotto, lavare accuratamente ogni superficie od oggetto con cui esso è venuto in contatto con acqua e sapone (od altro idoneo detergente);
- l'impiego del prodotto non è consentito su lettieri poste a contatto diretto con gli animali;
- l'impiego è consentito su lettieri con grigliato;
- irrorare il prodotto sulle pareti a livelli sufficientemente elevati così da evitare che gli animali possano lambire l'insetticida.

**CONFEZIONE:** Kg 5

**DA NON VENDERSI SFUSO.**

Presidio medico-chirurgico

Reg. n. 14566 del Ministero della Sanità

® marchio registrato