

## COLBROM PASTA

BIOCIDA

Esca topicida-ratticida pronta all'uso in formulazione pasta fresca a base di Bromadiolone con Denatonio Benzoato.

### COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Bromadiolone puro	g	0,005
Denatonio benzoato	g	0,001
Coformulanti, sostanze appetenti e coloranti q.b. a	g	100



### IL PRINCIPIO ATTIVO

Il Bromadiolone è da 6 a 10 volte più potente rispetto alle esche a base di anticoagulanti della vecchia generazione (Warfarin, Clorofacinone, ecc.). Come gli altri anticoagulanti, agisce opponendosi alla formazione della protrombina necessaria alla coagulazione del sangue provocando delle emorragie letali che portano alla morte dopo alcuni giorni, non inducendo diffidenza nei confronti dell'esca.

Per ragioni di maggior sicurezza, soprattutto nei confronti dei bambini, COLBROM PASTA contiene Denatonio Benzoato, che è considerato la sostanza più amara del mondo: inserita nelle esche topicide alla dose di 10 ppm (0,001%), può essere avvertita dal palato umano conferendo al formulato un sapore amarissimo che lo rende immangiabile. Alle stesse dosi non ha alcun effetto sui roditori che, quindi, se ne cibano avidamente.

### LE CARATTERISTICHE

COLBROM PASTA è efficace contro diversi tipi di roditori: topolini domestici, ratti grigi, ratti di fogna, ratti neri, ecc.

Il roditore, una volta ingerito il formulato in pasta fresca, muore lentamente per emorragia, senza destare sospetto nei componenti della colonia.

### L'APPLICAZIONE

COLBROM PASTA può essere usato all'interno e intorno gli edifici industriali (anche depositi merci e stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.

Impiegare le esche tal quali senza privarle dell'involucro, nei luoghi maggiormente frequentati dai roditori, avendo cura di collocarle all'interno di appositi contenitori robusti e richiudibili.

Utilizzare le esche finite e pronte all'uso all'interno degli appositi contenitori per esche già in commercio ("mangiatoie", "erogatori", "stazioni" ecc.) protetta dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente.

I contenitori devono essere posizionati a circa 5-10 m di distanza l'uno dall'altro.

Le dosi consigliate sono:

- Topolino domestico: 2 esche (40 g) x 100 mq
- Ratto grigio e ratto nero: 3-5 esche (60-100 g) x 100 mq

Segnalare adeguatamente la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le misure di primo soccorso. Sostituire settimanalmente le esche nei contenitori, se necessario. Rimuovere il prima possibile gli animali morti ed eliminarli secondo le norme previste.

### LA FORMULAZIONE

COLBROM PASTA è un topicida in pasta fresca in bustine da 20 g contenute nella confezione Pratika, facile da trasportare e richiudibile.

COLBROM PASTA viene rapidamente accettato dalle diverse specie di roditori, grazie agli appetenti e coformulanti alimentari di prima scelta impiegati per la sua formulazione.

### LE INDICAZIONI

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Da non impiegarsi in agricoltura.

Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la Colkim non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzazione dello stesso.

Prodotto Biocida (PT 14). Uso professionale.

Autorizzazione del Ministero della Salute N. IT/2013/00090/AUT

In base alle norme vigenti in materia di Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura dei preparati pericolosi - COLBROM PASTA è classificato (H360D) può nuocere al feto e (H372) provoca danni agli organi (sangue) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.



PERICOLO

colkim.it